


МЕЕЗИЯ БОЛОТНАЯ

Meesia uliginosa

Hedw.

Семейство МЕЕЗИЕВЫЕ —
Meesiaceae



Статус. III категория. Редкий вид.

Краткое описание. Верхоплодный одно- и двудомный вид. Дерновинки 1—4 см высотой, плотные, сверху зеленые, слабоблестящие, внутри коричневые, внизу войлочные. Стебель прямостоячий, ветвистый, восьмигранно-облиственный. Листья прямо отстоящие, 1—3 (6) мм длиной, линейно-ланцетные до узкоязыковидных, с широкой закругленной верхушкой, желобчатые, с цельными отвороченными краями. Жилка шириной до 1/2—2/3 основания листа, исчезает не доходя до верхушки. Ножка 1—8 см длиной, красная. Коробочка согнуто-грушевидная, слегка наклоненная. Спорогонии одиночные, характерен полиморфизм [1—4].

Распространение. Европа, Урал, Северо-Восточная, Восточная и Центральная Азия, Северная Америка, Гренландия. В России встречается в европейской части, Арктике, Сибири, на Кавказе, Урале, Дальнем Востоке [2]. В пределах Тюменской области отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе на Полярном Урале [1; 5], на п-ове Ямал, о-ве Белом [6; 7], на Гыданском п-ове (низовья р. Чугорьяха) [8]; на юге области — в районе г. Тобольска [9].

Экология и биология. Встречается по берегам водоемов, в низинных болотах, на сырых лугах, на влажном песке, сырых скалах и осыпях, на карбонатных почвах; в Арктике — в моховых, лишайниковых, кустарничково-осоковых и других тундрах. Эвтрофный гидрогигрофит [10].

Численность и тенденции ее изменения. Сведения отсутствуют.

Лимитирующие факторы. Низкая конкурентоспособность вида, особенности биологии, увеличение антропогенной нагрузки.

Меры охраны. Сохранение мест обитания, выявление новых местонахождений.

Источники информации: 1. Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа, 1997; 2. Абрамова, Савич-Любичкая, Смирнова, 1961; 3. Абрамов, Волкова, 1998; 4. Мельничук, 1970; 5. Дьяченко, 1999; 6. Чернядьева, 1993; 7. Чернядьева, 2001; 8. Чернядьева, 1994; 9. Lapshina, Muldijarov, 1998; 10. Дьяченко, 1997.

Составитель О. Г. ВОРОНОВА.