

в ноч. время. Особи держались поодиночке или парами, у добычи собирались группами. Раз в год рождали 2–4 (редко 6) детёнышей. Питались кр. падалью, разгрызая кости, недоступ. др. хищникам.

С. Н. Гашев

трофный мезофит. Растёт на лес. подстилке, почве, валежнике, в основании стволов деревьев, на скалах, валунах, кочках сфагн. болот, лугах, в тундрах и аркт. пустынях по всей террит. Тюмен. области.

О. Г. Воронова

**ГИЛОКОМИУМ БЛЕСТЯЩИЙ** (*Hylocomium splendens*), вид зелёных двудомных мхов сем. гилокомиевых (*Hylocomiaceae* Fleisch.).

Дерновинки Г. б. рыхлые, зелёные или жёлто-зелёные, до буроватых, дл. до 10 см и более, блестящие, образуют обшир. покровы, часто составляющие основу мох. яруса хвойных лесов. Стебель обычно красный, лежащий, восход или прямостоячий, моноподиально дважды перистоветвящийся, образует этажи, каждый из к-рых соответствует год. побегу. Он дуго-видно согнут, внизу без ветвей, с чешуевид. листочками, вверху дважды или трижды перисто-разветвл., с плоско распростёртыми ветвями и веточками. Стеблевые листья черепитч., вогнутые, слабо продольно складч., вверху иногда поперечно-волнистые, по краям мелкопильчатые, внизу слегка отвёрнутые. Жилка корот., двойная. Клетки линейные, толстостен., в основании листа оранжевые. Веточные листья заметно мельче стеблевых,



яйцевид.-эллиптич., коротко заострённые. Коробочка на красноватой ножке, дл. 1,5–2,5 см, наклонён, яйцевид, слегка согнутая. Крышечка высоко коническая с корот. клювиком. Спороносит весной. Мезоэн-