

ДИКРАНОВЫЕ (Dicranaceae Schimp.),
сем. однодомных или двудомных, иногда
ложнооднодомных многолетних мхов.



Dicranum bonjeanii

Представлено растениями от очень
мелких до кр., растущих отд. побегами
или, чаще, собран. в рыхлые или густые
подушковид. дерновинки; обычно зелёные
или жёлто-зелёные, блестящие. Стебель
прямостоячий, всесторонне равномерно

густо облиств., слабоветвящийся, у верхушки, как правило, скученно облиств., с обильными беловатым или ржавым ризоид. войлоком. Листья прямые или серповидно-огнутые и обращён. в одну сторону. Жилка простая, от узкой до довольно широкой, оканчивается в верхушке листа. Коробочка с конусовид. основанием, вскрывается крышечкой, с более или менее длин. и косым клювиком. Семейство включает ок. 50 родов и от 400 до 700 видов, растущих во всех природ. зонах всех континентов. Большая ч. видов растёт на почве, камнях, гниющей древесине, у основания стволов деревьев.

В Тюмен. обл. отмечено 29 видов и 1 разновидность, относящиеся к 3 родам: **онгстремия** (*Aongstremia*), **дикранум** (*Dicranum*), **дикранелла** (*Dicranella*); в тундре встречаются 22 вида и 1 разновидность, в лесотундре – 11, в тайге – 19. Произрастают во всех типах растит. сообществ: темнохвойных, светлохвойных, смешан., мелко- и широколиств. (липняки) лесах, на болотах и лугах. Виды рода дикранелла предпочитают открытые, часто наруш. местообитания: берега рек, обочины дорог, склоны оврагов, вывороты упавших деревьев. Относительное участие сем. в видовом разнообразии мхов Тюмен. обл. – 8,8 %. Только 1 вид сем. – **дикранум извилистостебельный** (*Dicranum flexicaule*) – встречается во всех природ. зонах и подзонах рег. на покрытых почвой камнях и скалах, иногда на гнилой древесине и у основания стволов. Широко распростран. виды: **дикранум Бонжана** (*Dicranum bonjeanii*), **дикранум буроватый** (*D. fuscescens*), **дикранум многоножковый** (*D. polysetum*), **дикранелла зобатая** (*Dicranella cerviculata*), **дикранелла шиловидная** (*D. subulata*). Редкие виды: **онгстремия длинноножковая** (*Aongstremia longipes*) и **дикранелла низкая** (*Dicranella humilis*) – отмечены на п-ове Ямал в подзоне юж. тундр. Автором в 2007 обнаружены единич. экземпляры **дикранеллы разнонаправленной** (*Dicranella heteromalla*) в темнохвойных лесах юж. подзоны лес. зоны на террит. Уватского р-на, **дикранум зеленоватый** (*Dicranum viridae*) найден лишь однажды в сред. под-

зоне лес. зоны на террит. заказника «Елизаровский» биологами О. Ю. Писаренко и Г. С. Таран.

О. Г. Воронова